



مؤشرات صحة الأم

Maternal Health Indicators

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

Palestinian Central Bureau of Statistics

التوزيع النسبي للأمهات اللواتي أمجن مولوداً حياً خلال العام السابق للمسح وتلقين مطعوم التيتانوس (الكزاز) حسب عدد الجرعات والخصائص الخلفية، 2000
Percentage Distribution of Mothers with a Live Birth a Year Preceding Survey Who Had Received Tetanus Toxoid by Number of Doses and Background Characteristics, 2000

Background Characteristics	المجموع Total	عدد الجرعات Numbers of Doses				الخصائص الخلفية
		لم تتلق أي جرعة Didn't Receive any Dose				
		لا تعرف Don't Know	تلقت على الأقل جرعتين Received at least 2 Doses	تلقت جرعة واحدة Received one Dose	لم تتلق أي جرعة Didn't Receive any Dose	
المنطقة						
West Bank	100	1.8	51.1	18.9	28.2	الضفة الغربية
Gaza Strip	100	0.4	58.9	35.9	4.8	قطاع غزة
Mother's Educational Attainment						المؤهل العلمي للأم
None	100	2.1	52.1	22.9	22.9	لا شيء
Elementary	100	1.2	52.0	23.0	23.8	ابتدائي
Preparatory	100	1.2	54.7	26.3	17.8	اعدادي
Secondary and Above	100	1.3	56.0	27.2	15.5	ثانوي وأعلى
Palestinian Territory	100	1.3	54.1	25.4	19.2	الأراضي الفلسطينية

لا تزال نسبة تلقي مطعوم التيتانوس منخفضة قياساً بنسبة تلقي الرعاية أثناء الحمل.

Percentage of tetanus toxoid coverage is still low, despite the increase of antenatal care percentage.

التوزيع النسبي للولادات (آخر ولادتين) حسب طبيعة الولادة وبعض الخصائص الخلفية، (1997 - 1999)
Percentage Distribution of Births (Last Two) by Nature of Delivery and Background Characteristics, (1997 - 1999)

Background Characteristics	المجموع Total	طبيعة الولادة Nature of Delivery					الخصائص الخلفية
		طبيعية الولادة Normal					
		قيصرية Caesarian	شفط Suction	ملقط Forceps	جرح/ توسيع Episiotomy	طبيعية Normal	
عمر الأم (سنوات)							
Less than 30	100	6.1	2.4	0.4	21.5	69.6	أقل من 30
30 - 49	100	13.1	2.2	0.1	8.2	76.4	49 - 30
المنطقة							
West Bank	100	9.4	2.0	0.3	15.6	72.7	الضفة الغربية
Gaza Strip	100	7.8	2.9	0.2	17.9	71.2	قطاع غزة
Mother's Educational Attainment							
None	100	2.1	52.1	22.9	22.9	لا شيء	
Elementary	100	1.2	52.0	23.0	23.8	ابتدائي	
Preparatory	100	1.2	54.7	26.3	17.8	اعدادي	
Secondary and Above	100	1.3	56.0	27.2	15.5	ثانوي وأعلى	
Palestinian Territory	100	1.3	54.1	25.4	19.2	الأراضي الفلسطينية	

يلاحظ ارتفاع نسبة الولادات التي تتم بعمليات جرح وتوسيع لدى الأمهات في الفئات العمرية الصغيرة أقل من 30 سنة، بينما ترتفع الولادات القيصرية كلما زاد عمر الأم.

Percentage of episiotomy deliveries increases among young age mothers less than 30 years, while caesarian deliveries increases as mother's age increases.

نسبة الامهات اللواتي تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل حسب جهة تقديم الرعاية أثناء الحمل والخصائص الخلفية، (1997 - 1999)
Percentage of Mothers Who Had Received Antenatal Care by Antenatal Care Provider and Background Characteristics, (1997 - 1999)

Background Characteristics	جهة تقديم الرعاية أثناء الحمل Antenatal Care Provider			الخصائص الخلفية
	طبيب Physician			
	داية Daya	ممرضة/ قابلة Nurse/Midwife	طبيب Physician	
عمر الأم (سنوات)				
Less than 30	0.2	33.2	77.3	أقل من 30
30 - 49	0.3	31.6	80.0	49 - 30
المنطقة				
West Bank	0.2	10.2	93.1	الضفة الغربية
Gaza Strip	0.3	70.6	53.2	قطاع غزة
Mother's Educational Attainment				المؤهل العلمي للأم
None	0.2	32.5	79.3	لا شيء
Elementary	0.0	30.6	79.2	ابتدائي
Preparatory	0.4	32.1	79.2	اعدادي
Secondary and Above	0.3	32.6	78.3	ثانوي وأعلى
Palestinian Territory	0.3	32.6	78.3	الأراضي الفلسطينية

معظم النساء الحوامل يتوجهن الى الطبيب لتلقي الرعاية أثناء الحمل، لحرصهن على تلقي الرعاية الصحية الأفضل.

Most of pregnant women received antenatal care at a physician's clinic for good quality of care.


نسبة النساء اللواتي تعرضن لمشاكل صحية أثناء الحمل حسب المشكلة والخصائص الخلفية، (1997 - 1999)
Percentage of Women Who Had Certain Health Problems by Health Problem and Background Characteristics, (1997 - 1999)

Background Characteristics	المشكلة الصحية Health Problem						الخصائص الخلفية
	تسمم حمل Eclampsia						
	إنتهابات في المسالك البولية UTI	نزف مهلي Vaginal Hemorrhage	ارتفاع ضغط دم High Blood Pressure	ولادة مبكرة Premature Delivery	سكري حمل Gestational Diabetes	تسمم حمل Eclampsia	
عمر الأم (سنوات)							
Less than 30	26.0	4.1	5.3	6.7	0.7	1.8	أقل من 30
30 - 49	20.9	5.3	11.3	6.7	2.3	2.9	49 - 30
المنطقة							
West Bank	27.5	4.5	6.4	7.2	1.4	2.2	الضفة الغربية
Gaza Strip	18.5	4.6	9.7	5.9	1.2	2.3	قطاع غزة
Mother's Educational Attainment							
None	21.9	4.2	10.0	4.5	2.5	3.4	لا شيء
Elementary	23.8	3.5	8.8	6.8	1.5	1.6	ابتدائي
Preparatory	27.0	5.3	7.0	7.6	1.0	2.5	اعدادي
Secondary and Above	22.2	4.6	6.3	6.5	1.0	2.0	ثانوي وأعلى
Palestinian Territory	23.3	4.6	7.6	6.7	1.3	2.3	الأراضي الفلسطينية

التهابات المسالك البولية من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً بين النساء الحوامل.

Urinary Tract Infection (UTI) is the most prevalent health problem among pregnant women.

التوزيع النسبي للولادات (آخر ولادتين) اللواتي تلقين الرعاية الصحية بعد الولادة حسب تلقي الرعاية الصحية أثناء الحمل والمنطقة، (1997 - 1999)
Percentage Distribution of Births (Last Two) Who Had Received Postnatal Care by Receiving Antenatal Care and Region, (1997 - 1999)



يلاحظ انخفاض نسبة تلقي النساء للرعاية الصحية بعد الولادة حتى بين النساء اللواتي تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل، كما يلاحظ انخفاض نسبة تلقي الرعاية الصحية بعد الولادة بين نساء غزة مقارنة مع الضفة الغربية.

Percentage of women receiving postnatal care is low even among those received antenatal care, and the percentage of receiving postnatal care in Gaza Strip is lower than the corresponding figure in the West Bank.


التوزيع النسبي للأمهات اللواتي تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل حسب طول فترة الحمل عند اول زيارة للمنطقة والخصائص الخلفية، (1997 - 1999)
Percentage Distribution of Mothers Who Had Received Antenatal Care by Duration of Pregnancy at First Visit and Background Characteristics, (1997 - 1999)

Background Characteristics	المجموع Total	لا تعرف Don't Know	المدة التي تقضيها المرأة أثناء الحمل عند أول زيارة للمنطقة Duration of Pregnancy at First Visit			الخصائص الخلفية
			أقل من 3 أشهر Less than 3 months			
			9-6	5-3	أقل من 3 أشهر Less than 3 months	
عمر الأم (سنوات)						
Less than 30	100	0.2	5.9	45.6	48.3	أقل من 30
30 - 49	100	0.3	7.0	49.7	43.0	49 - 30
المنطقة						
West Bank	100	0.3	3.9	30.9	64.9	الضفة الغربية
Gaza Strip	100	0.1	10.1	72.5	17.3	قطاع غزة
Mother's Educational Attainment						
None	100	0.9	10.8	43.3	45.0	لا شيء
Elementary	100	0.4	7.0	47.6	45.0	ابتدائي
Preparatory	100	0.1	5.8	45.6	48.5	اعدادي
Secondary and Above	100	0.1	5.7	49.0	45.2	ثانوي وأعلى
Palestinian Territory	100	0.2	6.3	47.2	46.3	الأراضي الفلسطينية

يلاحظ تدني نسبة المتابعة للحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى في الأراضي الفلسطينية (46.3%)، لا سيما في قطاع غزة (17.3%).

Percentage of pregnancy follow up during the first three months is low in Palestinian Territory (46.3%), mainly in Gaza Strip (17.3%).


التوزيع النسبي للولادات (آخر ولادتين) حسب جهة تقديم المساعدة أثناء الولادة والمنطقة، (1997 - 1999)
Percentage Distribution of Births (Last Two) by Assistance Provider At Delivery and Region, (1997 - 1999)



تشرف وتساعد القابلات والممرضات في الولادة على حوالي (44%) من الولادات في الضفة الغربية، مقارنة مع حوالي (23%) في قطاع غزة.

Midwives and Nurses are assisting at deliveries, mainly in the West Bank (44%) of total deliveries compared to (23%) in Gaza Strip.


نسبة الولادات (آخر ولادتين) اللواتي تلقت امهاتهم رعاية صحية بعد الولادة حسب عمر الام والمنطقة، (1997 - 1999)
Percentage of Births (Last Two) Whose Mothers Have Received Postnatal Care by Mother's Age and Region, (1997 - 1999)



تعتبر الرعاية الصحية بعد الولادة منخفضة مقارنة مع الرعاية الصحية أثناء الحمل، وهي في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة.

Percentage of women receiving postnatal care is lower than those receiving antenatal care, and it is higher in the West Bank than in Gaza Strip.


نسبة تلقي الامهات اقراص الحديد وحمض الفوليك أثناء الحمل (آخر ولادتين) حسب المنطقة، (1997 - 1999)
Percentage of Mothers Who Had Iron and Folic Acid Tablets During Pregnancy (Last Two) by Region, (1997 - 1999)



يلاحظ ارتفاع نسبة الامهات اللواتي تلقين اقراص الحديد وحمض الفوليك خلال الحمل في الضفة الغربية مقارنة مع النساء في قطاع غزة.

It is noted that high percentage of mothers received iron and folic acid tablets during pregnancy in the West Bank compared with Gaza Strip.


التوزيع النسبي للولادات (آخر ولادتين) حسب مكان الولادة، (1997 - 1999)
Percentage Distribution of Births (Last Two) by Place of Delivery, (1997 - 1999)



معظم الولادات تتم في مؤسسات صحية (94.8%)، ويلاحظ ارتفاع نسبة الولادات في المنزل في الضفة الغربية (7.7%) مقارنة مع قطاع غزة (0.8%).

Most deliveries occur at health facilities (94.8%), it is noticed that the percentage of home deliveries were higher in West Bank (7.7%) compared with Gaza Strip (0.8%).

نسبة النساء (15-49) سنة اللواتي يعانين من فقر الدم حسب المنطقة ونوع التجمع، 2002
Percentage of Women Aged (15-49) Years Who are Suffering from Anemia by Region and Type of Locality, 2002



بتمويل من مؤسسة فورد
Funded by Ford Foundation