



الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

# مؤشرات ديمغرافية وصحية من بيانات المسوح الصحية والديمغرافية والتعداد العام

كتيب جيب

ايار/ مايو 2002

صفر، 1423هـ - أيار، 2002.

جميع الحقوق محفوظة.

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2002. مؤشرات ديمغرافية وصحية من بيانات المسوح الصحية والديمغرافية والتعداد العام: كتيب جيب. رام الله - فلسطين.

جميع المراسلات توجه إلى دائرة النشر والتوثيق/ قسم خدمات الجمهور على العنوان التالي:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

ص.ب: 1647، رام الله، فلسطين.

هاتف: (970-2)2406340 فاكس: (970-2)2406343

بريد إلكتروني: [diwan@pcbs.pna.org](mailto:diwan@pcbs.pna.org) صفحة إلكترونية: <http://www.pcbs.org>

## شكر وتقدير

تم إنجاز هذا الكتيب بتمويل من مؤسسة (FORD).  
يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر  
والتقدير إلى مؤسسة (FORD) على توفيرها التمويل  
اللازم لإنجاز مجموعة من التقارير الصحية والديمغرافية.



## قائمة الجداول

الصفحة	الجدول
10	جدول:1 السكان الفلسطينيين حسب فئات العمر بالسنوات والمنطقة، 2001 :
12	جدول:2 توزيع الأسر الفلسطينية حسب نوع الأسرة،، (1997، 2000)
16	جدول:3 التوزيع النسبي للأفراد 12 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية حسب الحالة الزوجية الحالية والجنس والمنطقة، (1997، 2000)
17	جدول:4 نسبة الأمهات اللواتي تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل وبعد الولادة (آخر مولودين) حسب المنطقة، (1996، 2000)
18	جدول:5 التوزيع النسبي للولادات (آخر ولادتين) اللواتي تلقين رعاية صحية بعد الولادة حسب تلقي الرعاية أثناء الحمل والمنطقة، (1996، 2000)
19	جدول:6 نسبة الأمهات اللواتي تلقين أقراص الحديد وحمض الفوليك أثناء الحمل (آخر مولودين) حسب المنطقة، (1996، 2000)
21	جدول:7 التوزيع النسبي للامهات اللواتي أنجبن مولوداً حياً خلال العام السابق للمسح وتلقين مطعوم التيتانوس (الكزاز) حسب عدد الجرعات والمنطقة، 2000

22	نسبة النساء المتزوجات حالياً ويستخدمن حالياً وسيلة منع حمل حسب نوع الوسيلة والمنطقة، (1996، 2000)	جدول:8
23	نسبة النساء المتزوجات حالياً اللواتي لا يستخدمن حالياً وسيلة منع حمل حسب سبب عدم الإستخدام والمنطقة، (1996، 2000)	جدول:9
24	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون بصورة متوسطة من سوء التغذية حسب الجنس والمنطقة، (1996، 2000)	جدول:10
25	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً وتم الإطلاع على بطاقات التطعيم وتلقوا مطاعيم محددة حسب المنطقة، (1996، 2000)	جدول:11
27	التوزيع النسبي للأطفال (الطفل الأخير) الذين توقفت أمهاتهم عن ارضاعهم (القطام) حسب سبب القطام وعمر الطفل، (1996، 2000)	جدول:12
29	نسبة الأطفال 2-11 شهراً الذين تلقوا فيتامين (D / A) حسب المنطقة، (1996، 2000)	جدول:13

## قائمة الاشكال

### الجدول

### الصفحة

9	الهرم السكاني في الاراضي الفلسطينية (منتصف عام 2001)	شكل:1
11	متوسط حجم الأسرة الفلسطينية حسب نوع التجمع، (1997، 2000)	شكل:2
13	معدل الخصوبة الكلية حسب نوع التجمع، (1995، 1999)	شكل:3
14	معدل وفيات الرضع المقدرة بالطرق المباشرة للسنوات الخمس السابقة للمسح حسب المنطقة، (1995، 2000)	شكل:4
15	معدل وفيات الأطفال (أقل من 5 سنوات) المقدرة بالطرق المباشرة للسنوات الخمس السابقة للمسح حسب المنطقة، (1995، 2000)	شكل:5
20	التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) حسب طبيعة الولادة، (1996، 2000)	شكل:6
26	نسبة الاطفال (الطفل الاخير) حسب حالة الرضاعة الطبيعية، (1996-2000)	شكل:7
28	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالاسهال، التهابات في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين للمسح، (1996، 2000)	شكل:8






Figure 1

شكل 1

الهرم السكاني في  
الاراضي الفلسطينية  
(منتصف عام 2001)

Population  
Pyramid in The  
Palestinian  
Territory (Mid  
Year 2001)




جدول 1: السكان الفلسطينيون حسب فئات العمر بالسنوات والمنطقة، 2001

Table 1: Palestinian Population by Age Group in Years and Region, 2001

Age Groups (Years)	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank	فئات العمر بالسنوات
0-4	603595	234316	369279	4-0
5-9	511081	199208	311873	9-5
10-14	424637	164119	260518	14-10
15-19	343574	127063	216511	19-15
20-24	289729	102170	187559	24-20
25-29	245225	82012	163213	29-25
30-34	205318	65306	140012	34-30
35-39	170462	57747	112715	39-35
40-44	132417	42963	89454	44-40
45-49	91979	31684	60295	49-45
50-54	71298	25114	46184	54-50
55-59	55474	17206	38268	59-55
60-64	46407	14459	31948	64-60
65-69	41152	13276	27876	69-65
70-74	30410	9529	20881	74-70
75-79	19366	5792	13574	79-75
80+	16827	4627	12200	+80
<b>Total</b>	<b>3298951</b>	<b>1196591</b>	<b>2102360</b>	<b>المجموع</b>

**Figure 2**

شكل 2



متوسط حجم الأسرة  
الفلسطينية حسب نوع  
التجمع، (1997، 2000)

**Average Size of  
Palestinian  
Household by  
Type of Locality,  
(1997, 2000)**


جدول 2: توزيع الأسر الفلسطينية حسب نوع الأسرة، (1997، 2000)

Table 2: Distribution of Palestinian Households by Type of Household, (1997, 2000)

Household Type	2000	1997	نوع الأسرة
One Person Household	3.7	3.3	أسرة من شخص واحد
Nuclear Household	77.5	73.3	أسرة نوية
Extended Household	18.6	23.0	أسرة ممتدة
Composite Household	0.2	0.4	أسرة مركبة
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>المجموع</b>

**Figure 3**

شكل 3




معدل الخصوبة الكلية  
حسب نوع التجمع،  
(1999، 1995)

Total Fertility  
Rate by Type of  
Locality, (1995,  
1999)

Figure 4

شكل 4



\* The Demographic Survey in the West Bank and Gaza Strip-1995, and the Health Survey-2000


\* المسح الديمغرافي للضفة الغربية وقطاع غزة- 1995، والمسح الصحي- 2000

معدل وفيات الرضع المقدر بالطرق المباشرة للسنوات الخمس السابقة للمسح\* حسب المنطقة، (1995، 2000)

Direct Estimates of Infant Mortality Rate Five Years Preceding the Survey by\* Region, (1995, 2000)

Figure 5

شكل 5



معدل وفيات الأطفال (أقل من 5 سنوات) المقدر بالطرق المباشرة للسنوات الخمس السابقة للمسح حسب المنطقة، (1995، 2000)

Direct Estimates of Child Mortality Rate (Under-Five Years) for Five Years Preceding the Survey by Region, (1995, 2000)

جدول 3: التوزيع النسبي للأفراد 12 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية حسب الحالة الزوجية الحالية والجنس والمنطقة، (1997، 2000)

Table 3: Percentage Distribution of Persons 12 Years and Over in the Palestinian Territory by Current Marital Status, Sex, and Region, (1997, 2000)

Marital Status and Sex	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory		قطاع غزة Gaza Strip		الضفة الغربية West Bank		الحالة الزوجية والجنس
	2000	1997	2000	1997	2000	1997	
<b>Never Married</b>							<b>أعزب</b>
Males	47.1	45.8	46.0	44.8	47.7	46.4	ذكور
Females	37.8	35.7	37.2	34.6	38.1	36.3	إناث
<b>Married</b>							<b>متزوج</b>
Males	52.0	53.1	53.0	54.2	51.5	52.4	ذكور
Females	54.1	55.9	55.0	57.2	53.6	55.3	إناث
<b>Divorced</b>							<b>مطلق</b>
Males	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	ذكور
Females	1.4	1.1	1.6	1.4	1.3	1.0	إناث
<b>Widowed</b>							<b>أرمل</b>
Males	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	ذكور
Females	6.7	7.0	6.2	6.6	7.0	7.1	إناث
<b>Not Stated</b>							<b>غير مبدن</b>
Males	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	ذكور
Females	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.3	إناث



جدول 4: نسبة الأمهات اللواتي تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل وبعد الولادة (آخر مولودين) حسب المنطقة، (1996، 2000)  
 Table 4: Percentage of Mothers Who have Received Antenatal and Postnatal Care (Last Two Births) by Region, (1996, 2000)

Region	تلقين رعاية بعد الولادة Received Postnatal Care		تلقين رعاية أثناء الحمل Received Antenatal Care		المنطقة
	2000	1996	2000	1996	
West Bank	29.0	22.7	94.0	91.6	الضفة الغربية
Gaza Strip	21.4	14.0	98.3	95.4	قطاع غزة
<b>Palestinian Territory</b>	<b>26.3</b>	<b>19.7</b>	<b>95.6</b>	<b>92.9</b>	<b>الأراضي الفلستينية</b>

جدول 5: التوزيع النسبي للولادات (آخر ولادتين) اللواتي تلقين رعاية صحية بعد الولادة حسب تلقي الرعاية أثناء الحمل والمنطقة. (1996، 2000)

**Table 5: Percentage Distribution of Births (Last Two) Who Had Received Postnatal Care by receiving Antenatal Care and Region, (1996, 2000)**


Received Postnatal Care	Year	لم يتلقين رعاية اثناء الولادة Didn't Received Antetnatal Care		تلقين رعاية أثناء الحمل Received Antetnatal Care		السنة	تلقى الرعاية بعد الولادة
		Gaza Strip قطاع غزة	West Bank الضفة الغربية	Gaza Strip قطاع غزة	West Bank الضفة الغربية		
Received Postnatal Care	1996	0.0	2.8	14.4	24.0	1996	تلقين رعاية بعد الولادة
Received Postnatal Care	2000	8.3	27.3	20.9	30.0	2000	تلقين رعاية بعد الولادة
Didn't Receive Postnatal Care	1996	100	97.2	85.6	76.0	1996	لم يتلقين رعاية بعد الولادة
Didn't Receive Postnatal Care	2000	91.7	72.7	79.1	70.0	2000	لم يتلقين رعاية بعد الولادة

جدول 6: نسبة الأمهات اللواتي تلقين أقراص الحديد وحمض الفوليك أثناء الحمل (آخر مولودين) حسب المنطقة، (1996، 2000)  
 Table 6: Percentage of Mothers Who Had Iron and Folic Acid Tablets During Pregnancy (Last Two Births) by Region, (1996, 2000)

Region	حمض الفوليك Folik Asid		أقراص الحديد Iron Tablets		المنطقة
	2000	1996	2000	1996	
West Bank	47.8	44.0	81.5	54.7	الضفة الغربية
Gaza Strip	38.1	38.7	65.7	44.7	قطاع غزة
Palestinian Territory	44.3	41.7	75.8	50.4	الأراضي الفلسطينية

**Figure 6**

**شكل 6**



\* Others Include Suction, Labor Induction and forceps for 1996, and Without Labor Induction for 2000

\* اخرى للعام 1996 تشمل الشفط، والطلق الصناعي والملقط، بيانات 2000 فقط الشفط والملقط

التوزيع النسبي للمواليد  
(آخر مولودين) حسب  
طبيعة الولادة، (1996،  
2000)

**Percentage  
Distribution of  
Births (Last Two)  
by Nature of  
Delivery, (1996,  
2000)**

جدول 7: التوزيع النسبي للامهات اللواتي أنجبن مولوداً حياً خلال العام السابق للمسح وتلقين مطعوم التيتانوس (الكزان) حسب عدد الجرعات والمنطقة، 2000

Table 7: Percentage Distribution of Mothers With a Live Birth in the Year Preceding the Survey Who Had Received Tetanus Toxoid Vaccine by Number of Doses and Region, 2000

Number of Doses	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank	عدد الجرعات
Didn't Receive any Dose	19.2	4.8	28.2	لم تتلق أي جرعة
Received one Dose	25.4	35.9	18.9	تلقت جرعة واحدة
Receive at Least two Dose	54.1	58.9	51.1	تلقت على الأقل جرعتين
Don't Know	1.3	0.4	1.8	لا تعرف
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>المجموع</b>

جدول 8: نسبة النساء المتزوجات حالياً ويستخدمن حالياً وسيلة منع حمل حسب نوع الوسيلة والمنطقة، (1996، 2000)  
**Table 8: Percentage of Currently Married Women Currently Using Contraceptive Methods by Method and Region, (1996, 2000)**

Method Currently Used	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory		قطاع غزة Gaza Strip		الضفة الغربية West Bank		الوسيلة المستخدمة حالياً
	2000	1996	2000	1996	2000	1996	
Pill	5.8	3.8	6.0	2.7	5.7	4.3	حبوب
IUD	24.6	21.5	18.5	16.2	27.9	24.1	لواب
Any other modern Method	6.3	5.4	8.2	5.6	5.2	5.3	أي وسيلة حديثة أخرى
Any Method	51.4	45.2	46.1	33.9	54.3	50.7	أي وسيلة

جدول 9: نسبة النساء المتزوجات حالياً اللواتي لا يستخدمن حالياً وسيلة منع حمل حسب سبب عدم الإستخدام والمنطقة، (1996، 2000)

Table 9: Percentage of Currently Married Women Who Are Not Currently Using Contraceptive Methods by Reason and Region, (1996, 2000)

Reasons for not Using	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory		قطاع غزة Gaza Strip		الضفة الغربية West Bank		اسباب عدم الاستخدام
	2000	1996	2000	1996	2000	1996	
Oppose Family Planning	0.8	12.6	0.2	14.3	1.2	11.2	تعارض تنظيم الاسرة
Husband Oppose	5.7	17.7	5.9	21.8	2.6	14.5	الزوج غير موافق
Relative Oppose	0.2	1.3	0.4	1.0	0.1	1.5	معارضة الاقارب
Side Effects	13.1	10.8	10.1	10.3	15.1	11.2	الآثار الجانبية
Lack of Knowledge	0.3	2.1	0.3	2.3	0.3	2.0	عدم المعرفة
Cost Too Mutch	0.2	0.6	0.0	0.7	0.4	0.6	التكلفة مرتفعة
Inconvenient	4.0	3.7	3.5	3.0	4.2	4.3	عدم الارتياح للوسيلة
Menopause	10.6	43.6	11.9	39.9	9.7	46.5	سن الأمان
Religious Oppose	1.6	7.3	1.2	6.7	1.9	7.8	يتعارض مع المعتقدات الدينية

**جدول 10: نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون بصورة متوسطة من سوء التغذية حسب الجنس والمنطقة، (1996، 2000)**  
**Table 10: Percentage of Children Under Five Years Who Are Moderately Undernourished by Sex and Region, (1996, 2000)**

Sex and Region	الوزن مقابل الطول Weight for Height		الطول مقابل العمر Height for Age		الوزن مقابل العمر Weight for Age		الجنس و المنطقة
	2000	1996	2000	1996	2000	1996	
<b>Sex</b>							<b>الجنس</b>
Males	1.6	2.6	7.0	6.5	2.2	3.8	ذكور
Females	1.3	2.9	8.1	8.0	2.8	5.0	إناث
<b>Region</b>							<b>المنطقة</b>
West Bank	1.5	2.2	7.0	6.7	2.6	3.9	الضفة الغربية
Gaza Strip	1.4	3.7	8.3	8.2	2.4	5.2	قطاع غزة
<b>Palestinian Territory</b>	<b>1.4</b>	<b>2.7</b>	<b>7.5</b>	<b>7.2</b>	<b>2.5</b>	<b>4.4</b>	<b>الأراضي الفلسطينية</b>



جدول 11: نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً وتم الإطلاع على بطاقات التطعيم وتلقوا مطاعيم محددة حسب المنطقة، (1996، 2000)

Table 11: Percentage of Children 12-23 Months Whom Immunization Card was Seen and Received Specific Immunization by Region, (1996, 2000)


Vaccine	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory		قطاع غزة Gaza Strip		الضفة الغربية West Bank		المطعم
	2000	1996	2000	1996	2000	1996	
BCG	73.0	43.2	100.0	90.5	55.4	21.6	السل
Polio (3 <sup>rd</sup> Dose)	98.3	95.7	99.7	97.5	97.5	94.9	الشلل (الجرعة الثالثة)
Measles	92.7	48.9	98.2	93.2	89.1	28.7	الحصبة
MMR	74.7	64.1	77.5	61.2	72.8	65.5	والنكاف، الحصبة، والحصبة الألمانية
DPT (3 <sup>rd</sup> Dose)	98.7	96.3	99.4	97.5	98.2	95.8	الثلاثي (الجرعة الثالثة)
All Vaccines*	91.8	81.3	97.7	94.0	87.9	75.4	جميع المطاعيم*

\* الأطفال الذين اكملوا التطعيم: هم الذين تلقوا جرعة مطعم الحصبة وثلاث جرعات من مطعم الثلاثي وثلاث جرعات من مطعم الشلل

\* Children Who are Fully Vaccinated: Those Who Have Received Measles, Three Doses of DPT and Polio

Figure 7

شكل 7



نسبة الاطفال (الطفل  
الاخير) حسب حالة  
الرضاعة الطبيعية،  
(2000-1996)

Percentage of  
Children ( Last  
Child) by  
Breastfeeding  
Status, (1996,  
2000)

\* Data is not available for the Exclusive Breastfeeding in 1996

\* لم يتم جمع البيانات حول الرضاعة الطبيعية المطلقة عام 1996


جدول 12: التوزيع النسبي للأطفال (الطفل الأخير) الذين توقفت أمهاتهم عن ارضاعهم (القطام) حسب سبب الفطام وعمر الطفل، (1996، 2000)

Table 12: Percentage Distribution of Children (Last Born) Who Have Been Weaned by Reason of Weaning and Child's Age, (1996, 2000)

Reason of Weaning	الاطفال دون 5 سنوات Children Under 5		العمر عند الفطام (بالاشهر) Age at Weaning (Months)				سبب الفطام
			11-6		6>		
	2000	1996	2000	1996	2000	1996	
Mother is Sick	6.3	6.9	8.8	6.0	7.8	13.1	الام مريضة
Child is Sick	4.3	2.5	1.4	3.4	7.1	4.1	الطفل كان مريضاً
Insufficient Milk	21.8	17.7	32.5	18.4	36.3	41.4	حليب الام غير كافي
Desire to Work	1.7	1.0	3.6	1.6	2.3	1.9	الرغبة في العمل
Child Refused	11.0	16.2	15.8	28.4	23.1	31.0	رفض الطفل ثدي الام
Child Old is Suitable	33.2	36.4	7.9	9.7	1.5	0.3	وصول الطفل لعمر مناسب للقطام
Mother Became Pregnant	12.9	15.3	24.0	26.6	4.0	4.5	الام اصبحت حاملاً
Use of Family Planning Method	1.3	0.8	1.0	0.3	1.1	0.8	الرغبة في استعمال موانع الحمل
Other	7.5	3.2	5.0	5.6	16.8	2.9	أخرى
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>المجموع</b>

Figure 8

شكل 8



\* The Survey is the Health Survey in the West Bank and Gaza Strip 1996, 2000

\* يقصد بالمسح كل من المسح الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1996، 2000.

نسبة الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالاسهال، التهابات في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين للمسح، (1996، 2000)

Percentage of Children Under Five Years Who Had Diarrhea, Acute Respiratory Infection During the Two Weeks Preceding the Survey\*, (1996, 2000)

جدول 13: نسبة الأطفال 2-11 شهراً الذين تلقوا فيتامين (A / D) حسب المنطقة، (1996، 2000)  
 Table 13: Percentage of Children 2-11 Months Who Have Received Vitamin (A / D) by Region, (1996, 2000)

Region	Year		المنطقة
	2000	1996	
West Bank	57.0	47.6	الضفة الغربية
Gaza Strip	32.1	18.6	قطاع غزة
<b>Palestinian Territory</b>	<b>48.1</b>	<b>38.1</b>	<b>الأراضي الفلسطينية</b>

## List of Figure

Figure		Page
Figure:1	Population Pyramid in Palestinian Territory (Mid Year 2001)	9
Figure:2	Average Size of Palestinian Household by Type of Locality, (1997, 2000)	11
Figure:3	Total Fertility Rate by Type of Locality, (1995, 2000)	13
Figure:4	Direct Estimates of Infant Mortality Rate Five Years Preceding the Survey by Region, (1995, 2000)	14
Figure:5	Direct Estimates of Child Mortality Rate (Under-Five Years) for Five Years Preceding the Survey by Region, (1995, 2000)	15
Figure:6	Percentage Distribution of Births (Last Two) by Nature of Delivery, (1996, 2000)	20
Figure:7	Percentage of Children ( Last Child) by Breastfeeding Status, (1996, 2000)	26
Figure:8	Percentage of Children Under Five Years Who Had Diarrhea, Acute Respiratory Infection During the Two Weeks Preceding the Survey, (1996, 2000)	28

<b>Table</b>		<b>Page</b>
Table:7	Percentage Distribution of Mothers With a Live Birth in the Year Preceding the Survey Who Had Received Tetanus Toxoid Vaccine by Number of Doses and Region, 2000	21
Table:8	Percentage of Currently Married Women Currently Using Contraceptive Method by Method and Region, (1996, 2000)	22
Table:9	Percentage of Currently Married Women Who Are Not Currently Using Contraceptive Methods by Reason and Region, (1996, 2000)	23
Table:10	Percentage of Children Under Five Years Who Are Moderately Undernourished by Sex and Region, (1996, 2000)	24
Table:11	Percentage of Children 12-23 Months Whom Immunization Card was Seen and Received Specific Immunization by Region, (1996, 2000)	25
Table:12	Percentage Distribution of Children (Last Born) Who Have Been Weaned by Reason of Weaning and Child's Age, (1996, 2000)	27
Table:13	Percentage of Children 2-11 Months Who Have Received Vitamin (A\ D) by Region, (1996, 2000)	29

## List of Tables

Table		Page
Table:1	Palestinian Population by Age Group in Years and Region, 2001	10
Table:2	Palestinian Households by Type of Household, (1997, 2000)	12
Table:3	Percentage Distribution of Persons 12 Years and Over in the Palestinian Territory by Current Marital Status, Sex, and Region, (1997, 2000)	16
Table:4	Percentage of Mothers Who have Received Antenatal and Postnatal Care (Last Two Births) by Region, (1996, 2000)	17
Table:5	Percentage Distribution of Births (Last Two) Who Had Received Postnatal Care by receiving Antenatal Care and Region, (1996, 2000)	18
Table:6	Percentage of Mothers Who Had Iron and Folic Acid Tablets During Pregnancy (Last Two Births) by Region, (1996, 2000)	19





The **FORD** Foundation

has provided the necessary  
financial support for preparing  
this Pocket Book.

May, 2002

All Rights Reserved.

Suggested Citation:

**Palestinian Central Bureau of Statistics, 2002.** Health and Demographic Indicators of Census, Health and Demographic Surveys Data :*Pocket Book*. Ramallah - Palestine.

All correspondence should be directed to:

Dissemination and Documentation Department / Division of user services

Palestinian Central Bureau of Statistics

P.O.Box 1647 Ramallah, Palestine.

Tel: 970-2-2406340

Fax: 970-2-2406343

E-Mail: [diwan@pcbs.pna.org](mailto:diwan@pcbs.pna.org)

web-site: <http://www.pcbs.org>



Palestinian Central Bureau of Statistics

**Health and Demographic Indicators of  
Census, Health and Demographic Surveys Data**

**Pocket Book**  
May, 2002